



PRIMEROS AUXILIOS: AMPUTACIONES TRAUMÁTICAS

Son la pérdida de algún miembro, o parte de él, como consecuencia de un traumatismo.

¿Cómo actuar ante una amputación?

1. El tiempo es esencial

- **Tranquilizar a la víctima** (la amputación se suele asociar a un estado de shock) **y trasladarla a un lugar seguro.**
- **Evitar dar alimentos o líquidos al accidentado**, ya que no debe ingerir nada que pueda dificultar una posterior anestesia.
- **Llame al 112 informando de las circunstancias y estado de la víctima** (informando de su edad y sexo, el nivel y tipo de amputación, el mecanismo que la ha provocado, etc.), **promoviendo su traslado** (junto al miembro amputado) **al**

hospital de la forma más rápida posible.

2. Tratamiento de la parte amputada

- **Envolver la parte amputada** en gasas estériles o paños limpios.
- **Introducirla en una bolsa de plástico** limpia y cerrarla lo más herméticamente posible.
- **Llenar con agua una caja o bolsa de plástico** lo suficientemente grande **y añade hielo** en cantidad suficiente para que dure hasta su llegada al hospital.
- **Introducir la bolsa con la parte amputada dentro de ella.**
- **Recuerda:** No se debe colocar la parte amputada en ningún caso directamente en agua o en hielo.



1



2



3



3. Tratamiento del miembro amputado

- **Control de hemorragia:** rellenar el muñón con gasa estéril y posteriormente envolver el resto del miembro fuertemente con una venda, a ser posible elástica, con la suficiente presión para cortar la hemorragia, pero sin apretar en exceso, ya que esto impediría la llegada de sangre al resto de la extremidad. Si la hemorragia continúa a pesar de esta medida elevar el miembro durante unos minutos o colocar un manguito neumático (por ejemplo, el manguito del aparato de tomar la tensión arterial, si es que se dispone de él), aflojándolo cada 10 min durante al menos 2-3 min. Si de esta manera cede la hemorragia, no recolocar el manguito.

Recuerda: El torniquete solo está indicado ante un amputación donde la hemorragia sea imposible de controlar y corra peligro la vida de la persona.

- Si la herida está sucia limpiar con suero.
- Anotar los datos y tiempo del suceso.

4. Si no existe amputación completa

- **Envolver suavemente el miembro afectado con una venda elástica** hasta que ceda la hemorragia, pero no tan fuerte que impida la llegada de sangre al resto del miembro.
- **Ferulice la zona dañada** uniéndola a un trozo de material rígido.
- **Colocar una bolsa de hielo** sobre la zona afectada.

